

et basi tenuia, basi haud producta, ubi plerumque leviter carinata, petala plerumque ovata, obtusa vel rotundata. Antherae breviores, suborbiculares vel ovaes. Flores ♀: Cupula staminodialis dentibus triangularibus vel plus minus obscuris.

12. *Aiphanes Tessmannii* Burret nov. spec. — Acaulis. Petiolus 30 cm longus tantum visus, aculeis nigris usque 5 cm longis, paucis, setis flavidis vel brunneis densis. Lamina 1,20 m longa, ambitu elongato-elliptica. Rhachis sine ullo aculeo, setis jam descriptis tamen dense praedita, apice supra frondis bifurcationem in filum longum producta. Lobi apicales nervis primariis 7 percursi, 11—12,5 cm in maximum diam., rhacheos 11 cm amplectentes, angulum acutum includentes, margine interiore 20 cm longi, apice praemorso-lobulato-dentati. Segmenta reliqua uninervia, utrinsecus 19—20, sat regulariter sequentia, hinc inde spatio, plerumque modice majore, interjecto, infima quam sequentia breviora, media in costa media plus minus 28 cm, in margine superiore 32 cm longa, omnia pro genere perangusta, fere linearia, usque 2,5—3 cm circ. lata, margine superiore tantum caudato-producto, ceterum praemorso-denticulata, tenuia, utrinque viridia, subconcoloria, utrinque pilis longis, rigidis, flavidis sat dense praedita. Spadix inter graciliores, pars ramosa 45 cm longa. Pedunculus longus, setis flavidis dense vel potius sat dense obtectus. Spatha inferior, ut videtur, et setis nigricantibus, superior longissima, tenuis, angusta, setis flavidis praedita. Rami sat numerosi, longi, oculo inermi glabri, fortiter armato pilis perbrevis, flavidis dense vestiti. Glomeruli florem ♀ et ♂ plerumque unicum, raro vel rarissime ♂ 2 gerentes, ramorum inferiorum magnam partem occupantes, supra flores ♂ fere semper solitarii. Flores ♂ glabri, parvi, sub anthesi, omnino aperti, petalis reflexis 3 mm in diam. vix superantes, in alabastro potius latiores quam alti, apice rotundati. Calyx explanatus, tenuis, basi haud productus, sepalis fere oblongis vel anguste oblongis. Petala late vel latissime ovata, apice rotundata vel obtusa, extus distincte longitudinaliter nervosa. Stamina 6. Filamenta brevia, inferne dilatata. Antherae parvae, ovaes. Pistillodium valde rudimentarium, tuberculare. Flores ♀: Sepala late rotundata. Petala basi connata, lobis valvatis. Cupula staminodialis dentibus obscuris. Gynaeceum jam fecundatum.

Ostperu: Mündung des Santiago, 160 m ü. d. M., flutfreier Hochwald. Kein Stamm. Weibliche Blüten hellgrün (blühend 13. Oktober 1924 — G. TESSMANN n. 4281).

Eine sehr ausgezeichnete Art.