

551. *Mooreanum* Wendl. & Drude.
„Moore's S.“
Lepidorhachis Wendl. —

Kentia F. Müll.
Lord Howe-Insel (bis 2500'
Höhe).

75. **Cyphokentia**

Brgt. Compt. Rend. Acad. Scient. Paris. 1873, 27, 399 exparte.

Höckerkentia.

Benth. & Hook. Gen. pl. III., II. 894, 25.

Stamm aufrecht, stark, unbewehrt. Blätter endständig, gefiedert; Segmente fast schwertförmig, lederig. Kolben kräftig, glatt, starkverzweigt. Blüten monoecisch. Frucht klein, kugelig oder elliptisch, einsamig mit klumpigem Perikarp.

Samen elliptisch oder rund. Scheiden 2, abfallend.

552. *macrostachya* Brgt., Frucht fast rund. „Großsährige II.“
Kentia Brgt. & Gris.
Neukaledonien.

553. *robusta* Brgt., Frucht fast nierenförmig-elliptisch. „Starke II.“
Kentia Brgt. & Gris.
Neukaledonien.

76. **Cyphosperma** H. Wendl. in litt.

Höckersame.

Brgt. Compt. Rend. Acad. Sc. Paris. I. 27. 5. — Benth. & Hook. Gen. pl. III., II. 895, 26.

Stamm unbewehrt, geringelt. Blätter endständig, gefiedert; Segmente lederig, langschwertförmig, am Ende schräg abgebissengezähnt. Kolben leichtbehaart oder kahl, fast doppelreihig verzweigt. Blüten monoecisch, braun.

Frücht klein, kugelig oder fast würfeligoval, braun, mit dünnbrüchigem Perikarp.

Samen höckerig oder fast spitzkantig.

554. *Balansae* Wendl., Frucht kugelig. „Balansa's H.“
Kentia Brgt. & Gris. — *Cyphokentia* Brgt.
Neukaledonien.

555. *Vicillardii* Wendl., Frucht stumpf 4-5 kantig. *Vicillard's* H.“
Kentia (*Cyphokentia*) Brgt.
Neukaledonien.

77. **Microkentia** Wendl. Benth. & Hook. Gen. pl. III., II. 895, 27.

Kleinkentia.

Stamm unbewehrt, rohrartig, schlank, geringelt. Blätter endständig, fiederschnittig, Segmente langschwertförmig zugespitzt,