

die Bemerkungen zu *D. fuscum*. Gegenüber *D. platysepalum* sind die Samen bedeutend kleiner und entbehren völlig der Einschnürung über dem Äquator. Auch sind die Blumenblätter der männlichen Blüten in der Form verschieden.

Dictyocaryum platysepalum Burret nov. spec. — Caudex solitarius, gracilis, cinereus, circ. 13—20 m altus, 0,50—0,65 m in diam. Frondes circ. 4,65—5,35 m longae, semierectae, pariter pinnatisectae, crispae. Petiolus crassitudine brachii humani. Segmenta in vivo atroglaucous, utrinsecus 30—34, laciniis partialibus 243, in directionibus variis abeuntia, rigida, in sicco supra atroviridia, subtus stratu tenui albo-ceraceo obtecta, apice praemorsa, \pm in lacinias partiales ad 12 fissa, maxima visa ad 1 m fere longa. Laciniae exteriores quam interiores latiores, anguste cuneatae, intimae angustae. Frondis apex furcatus, segmentis simplicibus, cuneatis, pro rata brevibus. Spadix juvenis 1,85 m circ. longus spathis 3 involucrat, longe acuminatus, in vivo albo-glaucus, fructifer patens, duplicato-ramosus, ramis pendulis. Rami primarii visi glabri, 12,5—13,5 cm longi, basi incrassati, dein rotundato-applanati, fructiferi sicci in dimidio 7—10 mm lati, visi ramis secundariis 3. Rami secundarii longissimi visi 38 cm longi, sed longiores, omnes apice destructi, in dimidio 5 mm in diam., in parte visa ex cicatricibus floribus in triadibus sat laxe dispositis, femineo duobus σ superpositis, teretes, in sicco leviter longitudinem secus rugulosi. Flores σ sub anthesi delapsi 6 mm longi. Sepala basi protracta, 1 mm alta, late rotundata. Petala oblonga, apice acutiuscula, latitudine 2 mm paulo superantia, dorso levissime longitudinaliter striata. Filamenta brevissima. Antherae lineares, 4 mm longae. Fructus laeves, subnitentes, fere globosi, in sicco circ. 3,5 cm alti, 3 cm et ultra lati. Pericarpium 1 mm paulo superans. Seminis testa tenuiter flavido-pergamena. Semen late ovato-ellipticum, siccum 2,5 cm altum, in tertio inferiore 2,2 cm latum, paulo supra aequatorem dorso latiuscule conspicue constrictum.

Colombia: Dep. Antioquia, La Mesa, Wald, 1650—2000 m, in großen Gruppen. Stamm einzeln, weißgrau, schlank. Wedel fast rund, Fiedern steif, lederartig, unterseits bläulich weiß, glatt. Früchte glatt, später zerreißen, Fleisch süßlich, dunkelbraun, einheimischer Name „Barigone“ (6. Mai 1880 — W. KALBREYER n. 1676).

Vergleiche die Bemerkungen zu *D. Schultzei*.

Dictyocaryum Lamarckianum (Mart.) H. Wendl. in Bot. Ztg. XXI (1863) 131; — *Iriarteia Lamarckiana* Mart. Palmet. Orbign. (1847) 18 tab. XII fig. 3 et tab. XX A, Hist. Nat. Palm. III (1833/50) 314 tab.