

10. — **DYPSIS VIRIDIS** nov. sp.

Gracillima, caudice 5-7 mm. diam., internodiis 1 cm. 5-2 cm. diam. Folia viridia diluta, petiolata (5-6 cm.), segmentis fere aequalibus, vel interdum 8-10, quorum nonnulla angustiora, lateralibus ovatis, leviter sigmoideis, acuminatis, 2 cm. 5-3 cm. 5 latis, longe decurrentibus, terminalibus aliquid latioribus, in flabellum 14-15 cm. longum, 8 cm. latum, alte (8 cm.) furcatum, basi confluentibus. Spadix folia æquans, pendens, simpliciter vel duplo ramosus, squamulis laciniatis plus minus rapide caducis indutus. Florum glomeruli bractea communis triangularis, laciniato-barbata. Flos masculus 3 staminibus, lato filamentis, connectivo crasso, loculis lateralibus.

Forêt orientale, à 400 mètres d'altitude, dans les environs de la baie d'Antongil (P. B., oct. 1912, 12057).

Forêt de Fananehana, environs de la baie d'Antongil (P. B., 12031.) Espèce à rejets.

11. — **DYPSIS LINEARIS** nov. sp.

Gracilis, usque ad 2 m. alta, caudice usque ad 3 cm. diam. Folia longe (9-13 cm.) petiolata; 6-9 segmentis, lateralibus non decurrentibus, 15-23 cm. longis, 1 cm. latis, terminalibus fere similibus, basi vix (1 cm.) decurrentibus. Spadix simpliciter ramosus, 45 cm. longus, indumento paleaceo-ramentaceo fusco hirtus, ramulis 2-3 cm. longis. Bractea communis margine haud laciniato-barbato. Flos masculus 3 staminibus, connectivo crasso loculisque pendentibus. Floris fœminei ovarium initio subglobulosum vel turbinatum, deinde gibbosum, stigmatibus lateralibus.

Forêt orientale, près de la rivière Anove, à 200 mètres d'altitude (P. B., sept. 1912, 12066).

12. — **DYPSIS PLURISECTA** nov. sp.

Gracilis, caudice 7-8 mm. diam. Folia petiolo subnullo, 8-10 segmentis plus minus inæqualibus, lateralibus lanceo-