

Fort-Dauphin (Scott Elliot, 2419, 4190, herbier de Kew, d'après M. Beccari).

Sur les gneiss des bois du Bas-Biennana, dans le bassin du Matitana, vers 175 mètres (P. B., oct. 1911, 12059).

Amalamazaotra, vers 800 mètres (P. B., 12010, 12092),

Gneiss des bois du Faraony, vers 400 mètres (P. B., déc. 1911, 11934).

Gneiss des forêts du Ramena et bois d'Ambaliha (Sambirano), vers 400 mètres (P. B., 11955). Ce Palmier abonde dans les forêts du Sambirano entre 300 et 600 mètres, et il est, en cette région du Nord-Ouest, plus robuste et plus élevé que dans l'Est.

Dans le Sambirano, le *Dypsis gracilis* est le *tsingovatrovatra* des indigènes; dans l'Est, les Tanala le nomment *hova* et *tsobolo*.

C'est une espèce sans rejets.

16. — **DYPSIS FASCICULATA** nov. sp.

Gracilis, 3-4 m. alta, caudice 15-20 mm. diam., internodiis 15 mm. longis. Folia 80 cm. minimum longa, breviter petiolata, segmentis numerosis, solis, vel 2-4 fasciculatis, lanceolatis, angustis (10-15 mm.), acuminatis, basi non decurrentibus, etiam binis terminalibus. Spadix 70 cm. et plus longus, duplo-ramosus, indumento paleaceo-ramentaceo fusco vestitus, ramulis filiformibus, 20 cm. longis. Flores minimi; masculus 3 staminibus filamentis crasso, loculis fere globosis, pendentibus.

Colline des environs d'Antalaha, sur la côte Nord-Est, vers 50 mètres d'altitude (P. B., nov. 1912, 12042).

Espèce à rejets.

17. — **DYPSIS LONGIPES** nov. sp.

Gracillima, foliis simplicibus, longe cuneatis, 40 cm. longis, profunde furcato-bifidis, petiolo 15 cm. longo. Spadix indivisus, squamulis laciniatis nigrescentibus vestitus. Glomeruli bractea communis concava, integra. Floris masculi 3 stamina loculis ellipticis, lato brevique connectivo appensis.

Forêt orientale des environs de Rantabé, dans la baie d'Antongil, vers 300 mètres (P. B., oct. 1912, 12030).

Espèce à rejets.

18. — **DYPISIS LOUVELII** Jum. et Perr.

Bois humides d'Analamazoatra, vers 800 mètres d'altitude (P. B., février 1912, août 1912 et septembre 1913, 11968, 11969, 12017).

L'espèce est sans rejets.

19. — **DYPISIS HIRTULA** Martius.

Sans indication de localité (herbier de Munich, d'après M. Beccari).

Nous avons fait remarquer plus haut, en note, que les feuilles du pied photographié par M. Beccari ressemblent énormément aux feuilles à limbe simple du *Dypsis forficifolia*.

On remarquera que, de ces dix-neuf *Dypsis*, dix-huit appartiennent exclusivement au versant oriental de Madagascar ; un seul, le *Dypsis gracilis*, tout en étant encore une espèce de l'Est, où elle redescend même jusqu'à Fort-Dauphin, se retrouve dans le Nord-Ouest, dans l'Ankaizina et le Sambirano.
