

elles ont été signalées par les divers collecteurs, mais nous donnerons une courte diagnose — latine, puisqu'elle nous est ainsi imposée — de nos espèces nouvelles.

L'ordre sera celui de notre tableau dichotomique.

1. — **DYPSIS HILDEBRANDTII** Beccari.

Ce Palmier, d'après M. Ch. d'Alleizette, est appelé *tsirika* dans le Mandraka.

On le trouve dans la forêt orientale, vers les limites du Centre.

Sous-bois d'Ambatolava, vers 500 mètres d'altitude (P. B., 11989).

Bois des collines d'Analamazaotra, vers 800 mètres (P. B., 11957, 11963, 11990).

Forêt de Mandraka (d'Alleizette, août 1906, 1061).

L'espèce est à rejets, et, par conséquent, pousse en touffes.

2. — **DYPSIS MOCQUERYSIANA** Beccari.

Forêt de l'intérieur de la baie d'Antongil (Mocquerys, 333, herbier de Candolle, d'après M. Beccari).

Nosy Mangabé, au fond de la baie d'Antongil (*Id.* 419, même herbier, d'après M. Beccari).

3. — **DYPSIS MANARANENSIS** nov. sp.

Gracilis, usque ad 2 m. alta, caudice 7-9 mm. diam. Folia simplicia (lamina 35-40 cm. longa, 10-18 cm. apice lata, alte furcata usque ad 27-34 cm.) vel 4 segmentis, quorum inferiora 45 cm. longa et 3 cm. 5 lata, et superiora angustiora, 40 cm. longa et 2 cm. lata. Spadix gracilis, 35-45 cm. longus, plerumque simpliciter ramosus, raro basi duplo-ramosus; ramulis 3 cm. 5-5 cm. longis. Florum glomeruli bractea communis bracteolæque integræ. Floris masculi 3 stamina brevi filamentis, lato connectivo, brevibus appendicibus loculis.

Præcedenti affinis, a qua tamen differt segmentis minus decurrentibus præsertimque bracteolis integris, haud barbato-ciliatis.

Forêt orientale, près de la Manarana, à 200 mètres d'altitude (P. B., oct. 1912, 12064 et 12067).

Espèce à rejets.

4. — **DYPSIS PROCERA** nov. sp.

Gracilis, 4-5 m. alta, sed caudice 15 mm. diam. haud superanti. Longissimum (18 cm). petiolum, 7 mm. latum, subtus convexum, supra leviter concavum, marginibus acutis; 4-8 segmenta, 40 cm. longa (35-45 mm. lata), basi decurrentia, terminalia lateralibus plus minus similia. Spadix 80 cm. longus, simpliciter vel duplo ramosus, ramulis 30 cm. et plus longis. Bractea communis integra. Floris masculi 3 stamina filamentato lato, connectivo brevi latoque, loculis oblongis pendentibus.

Forêt orientale, à Fananehana, dans les environs de la baie d'Antongil, vers 400 mètres (P. B., oct. 1912, 12089).

5. — **DYPSIS LANCEANA** Baill.

Nosy Mangabé, dans le fond de la baie d'Antongil (Mocquers, 1897, 412, 418, 420, dans l'herbier de Candolle, d'après M. Beccari).

Bois des environs de la baie d'Antongil, à 100 mètres d'altitude (P. B., oct. 1912, 12048).

Espèce à rejets.

6. — **DYPSIS FORFICIFOLIA** Martius.

Sainte-Marie (Boivin, 1847-1852, herbier du Muséum de Paris).

Environs de la baie d'Antongil, à Fananehana, vers 400 mètres d'altitude (P. B., oct. 1912, 12027 et 12091).

Peut-être faut-il rattacher à cette espèce, malgré son inflorescence beaucoup plus réduite, un Palmier de la Haute-Sahany dont les feuilles sont formées de limbes simples, de 33 centimètres de longueur sur 7 centimètres de largeur, échancrés sur 5 centimètres seulement. En tout cas, la structure anatomo-