

latis, angustis, 10-11 cm. longis, 17 mm. latis, longe acuminatis, basi decurrentibus (2-3 cm.), binis terminalibus leviter latioribus, 10 cm. longis, 20 mm. latis, basi (3 cm. 5, 4 cm.) in flabellum alte fureatum confluentibus. Spadix simpliciter ramosus, 8-10 ramulis gracilibus, puberulentis, 2-3 em. longis. Florum glomeruli bractea communis integra ; floris masculi 3 stamna brevi filamento, lato connectivo, loculis pendentibus.

Environ de Maroantsetra (P. B., 11966).

13. — **DYPsis MONOSTACHYA** nov. sp.

Gracilis, foliis longe (8 cm.) petiolatis, 8-10 segmentis, quorum bina terminalia trunca ta subdupo vel duplo lateralis latiora, basi decurrentia (3 cm.-3 cm. 5), lateralia angusta (12 mm.), acuminata, basi haud vel vix decurrentia. Spadix foliis brevior (25 cm.), indivisus, squamulis laciniatis conspersus ; flos masculus 3 staminibus, filamentis latis, in cupulam brevem basi connatis.

Bois des environs de Rantabé, dans la baie d'Antongil, vers 500 mètres d'altitude (P. B., oct. 1912. 12047). Espèce à rejets.

14. — **DYPsis MASOALENSIS** nov. sp.

Gracillima, 1 m. 50 alta, caudice 5-6 mm. diam., internodiis 2 em.-2 cm. 5 longis. Folia breviter (3 cm.) petiolata, 10-12 segmentis ovatis-sigmoideis, inæqualiter latis, valde decurrentibus, acuminatis, binis terminalibus apice truncatis, ibique extra denticulatis, in flabellum basi confluentibus. Spadix simpliciter vel duplo-ramosus, numerosis squamulis laciniatis vestitus, paucis ramulis sparsis, 3-4 cm. longis ; florum glomeruli bractea triangularis, margine laciniato-barbato.

Forêt de Masoala, vers 300 mètres (P. B., oct. 1912, 12034). Espèce à rejets.

15. — **DYPsis GRACILIS** Bory

Hauteurs de Tanambo, à Sainte-Marie (Boivin, 1851, herbier du Muséum de Paris, d'après M. Beccari).