

Forêt orientale, près de la Manarana, à 200 mètres d'altitude (P. B., oct. 1912, 12064 et 12067).

Espèce à rejets.

4. — **DYPSIS PROCERA** nov. sp.

Gracilis, 4-5 m. alta, sed caudice 15 mm. diam. haud superant. Longissimum (18 cm). petiolum, 7 mm. latum, subtus convexum, supra leviter concavum, marginibus acutis; 4-8 segmenta, 40 cm. longa (35-45 mm. lata), basi decurrentia, terminalia lateralibus plus minus similia. Spadix 80 cm. longus, simpliciter vel duplo ramosus, ramulis 30 cm. et plus longis. Bractea communis integra. Floris masculi 3 stamina filamentato lato, connectivo brevi latoque, loculis oblongis pendentibus.

Forêt orientale, à Fananehana, dans les environs de la baie d'Antongil, vers 400 mètres (P. B., oct. 1912, 12089).

5. — **DYPSIS LANCEANA** Baill.

Nosy Mangabé, dans le fond de la baie d'Antongil (Mocquers, 1897, 412, 418, 420, dans l'herbier de Candolle, d'après M. Beccari).

Bois des environs de la baie d'Antongil, à 100 mètres d'altitude (P. B., oct. 1912, 12048).

Espèce à rejets.

6. — **DYPSIS FORFICIFOLIA** Martius.

Sainte-Marie (Boivin, 1847-1852, herbier du Muséum de Paris).

Environs de la baie d'Antongil, à Fananehana, vers 400 mètres d'altitude (P. B., oct. 1912, 12027 et 12091).

Peut-être faut-il rattacher à cette espèce, malgré son inflorescence beaucoup plus réduite, un Palmier de la Haute-Sahany dont les feuilles sont formées de limbes simples, de 33 centimètres de longueur sur 7 centimètres de largeur, échancrés sur 5 centimètres seulement. En tout cas, la structure anatomo-