

der Unterseite des flachen Samens im Zentrum, wo er senkrecht orientiert ist.

Als Typus der Gattung wird die genauer bekannte *E. orthoschista* Burret vorgeschlagen.

*Eleiodoxa conferta* (Griff.) Burret nov. comb. — *Zalacca conferta* Griff. in Calc. Journ. Nat. Hist. V (1845) 16, Palms Brit. East India (1850) 19, t. 180 A, B, C. — Martius, Hist. Nat. Palm. III (1838) 201, t. 173, 174, Z XVIII, f. 29, Z XXII, f. 13, Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI (1893) 473, Becc. in Ann. Bot. Gard. Calcutta XII, II (1918) 95, t. III, f. 18—21, t. 60.

Malayische Halbinsel, Bangka, Borneo.

Es scheint mir nicht unmöglich, daß das Vorkommen auf Bangka zu *E. orthoschista* gehört. Auch von Borneo liegt kein Material vor.

*Eleiodoxa orthoschista* Burret nov. spec. — Frondis vagina ut petiolus subtus aculeis transverse vel oblique seriatim insertis 4—5 cm circ. longis armata, vagina dense costata, inferne fusco-leprosa. Petiolus visus supra vaginam latam 2 cm diam. Frondis rhachis subtus aculeis brevius seriatis, minoribus. Segmenta regulariter disposita, ensiformia, acuminata, nec basi, nec apice curvata, utrinque viridia, subtus paulo pallidiora, visa 50 cm circ. longa, costa media superne in latere superiore setosa, praeter costam mediam costis ulterioribus 2 validioribus, nervis transversalibus dense sequentibus, optime conspicuis. Spadix ♀ spicas complures nascens, quam spathae suae ± fissae tertia vel dimidia parte, quam inferiores etiam ultra longiores. Spicae 11 cm circ. longae, 10 mm diam., basi circ. 2 cm longe robuste pedunculatae, densissimae. Flores ♂ 6 mm longi. Calyx robustus, longitudinaliter dense costatus, profunde in segmenta 3 fissus. Corolla petalis 3 liberis superne anguste triangulariter productis, basi in stipitem crassum connatum exiens. Stamina 6, filamentis subulatis, antheris sterilibus, rudimentariis. Fructus subglobosi, apice leviter depressi, brevissime rostrati, basi subito contracti et dein modice producti, nondum maturi 1,2 cm diam. Squamae pallide brunneae, apice adpresso, marginibus tenuioribus, colore obscurioribus, in seriebus verticalibus 22 dispositae. Semen unicum nondum maturum 6 mm vel paulo ultra latum, supra conspicue late excavatum, subtus late rotundatum et leviter productum.

Malayische Halbinsel: Insel Singapore, Turong (E. T. H. Corner, Singapore Field n. 26200). Typus. — Lingga Archipel, P. Lingga Panggak, ± 60 m, einh. Name „Asam paja“ (Binnermeyer n. 7061).