

Au sud de la Maringa, 28 octobre 1913 (Nannan, n. 65. — Très fréquent dans les forêts marécageuses. — Nom ind. : Djodu).

Obs. — Plante caractérisée par des fascicules de 3 fleurs femelles postérieures et de 8 ou 6 fleurs mâles antérieures.

EREMOSPATHA *Mann et Wendl.*

Eremospatha Laurenti *De Wild.* nov. spec.

Foliis pennatis, 1 m. 50 longis, basi vaginantibus, vagina apice ligulata, ligula plus minus oblique abscissa, integra, circ. 2 cm longa, rachide basi circ. 2,5 cm. lato, pars inferiore supra leviter canaliculato, pars superiore supra plus minus carinato subacuto, infra basi carinato-subacuto, apice rotundato; cirrha...; rachide basi lateraliter plus minus dense spinoso, spinis plus minus recurvatis, patulo-erectis, usque 5 mm. longis; foliolis basilaribus plus minus reductis, linearilanceolatis usque 8 cm. longis et 3 mm. latis, spinis 5 mm. longis exceptis; foliolis medianis lanceolatis usque 47 cm. longis 4,2 cm. latis, margine plus minus dense ciliato-spinosis, spinis patulo-erectis, vel raro recurvatis, 4-5 mm. longis, nervis numerosis utrinque nervo mediani ultra 10, paullo prominentibus; inflorescentiis axillaribus, rachide ultra 40 cm. longo, ramoso, ramis circ. 36, basi circ. 2 mm. latis; 9-23 cm. longis; floribus geminatis, oppositis vel alternis, 2-6 mm. distantibus; calyce campanulato-cupulato, basi truncato, 3 mm. circ. longo, trilobato, lobis subrotundatis; corolla 7-8 mm. longa, obovoidea, 3-lobata, lobis circ. 3,5 mm. longis, staminibus 6, filamentis late connatis.

Entre Bolobo et Yumbi, 14 avril (M. Laurent, n. 645).

Obs. — Espèce voisine des *E. macrocarpa* et *E. Sapini*.

Eremospatha Sapini *De Wild.* nov. spec.

Foliis pennatis vaginantibus, vagina apice ligulata, ligula tubulosa 2-4 cm. longa, apice integra oblique abscissa, circa medium plerumque uni vel bi-transversaliter replicata, rachide basi 15-60 mm. lato, infra applanato-rotundato, supra carinato-obtusum, apice cirrhoso, cirrha ultra 1 m. longa, spinosa, spinis subulatis, erectis vel vulgo recurvatis, alternis vel oppositis, triquetris, usque 4 cm. longis, rachide basi et lateraliter plus minus dense spinoso, spinis recurvatis vel erectis, apice nigrescentibus usque 3,5 mm. circ. longis, apice paullo ar-