

sime cuneata, marginibus superioribus leviter rotundato-undulato-lobulatis, apice late obtuso, lateribus late rotundatis, superiora 2 utrinsecus opposita geminata, reliqua alternantia, sed regulariter disposita, inferiora ad margines aculeata, aculeis inferioribus tantum retrorsis, omnia inter robustiora, utrinque viridia, nitentia, glaberrima, dextra sinistra costae mediae nervis secundariis validioribus longitudinalibus 5—6. Spadicis nondum plane evoluti pars ramosa 20 cm longa, pedunculi fragmentum 12 cm longum visum. Rami oppositi, per paria 8. Paria inferiora supra bracteam annularem, in dimidia 4 mm altam, infra ramos leviter productam, acutam inserta, rami superiores haud oppositi, nonnihil supra bracteam liberam triangulariter acutam orientes. Rami ut rhachis i. s. densissime, brevissime atrorubiginoso-piloso-papilloso-furfuracei, inter minus longos, rigidos. Flores per paria alternantia, paria omnia disticha, basi bractea \pm triangulari, unguiformi suffulta. Flores nondum aperti minute papilloso-pilosi. Calyx late trilobus, lobis late rotundatis. Corolla quam calyx 3—4-plo longior, visa fere cylindrica, partim \pm inflata. Urceolus staminalis leviter 6-lobatus, dentibus minutis 6 coronatus, antheris parvis, ovalibus, dentibus insertis.

Portugiesisch Kongo: Maiombe, Nkonda Mbaku, nahe dem Luali-Fluß, ca. 50 m über d. Meer (J. Goßweiler n. 10088).

Die Art ist ausgezeichnet durch die großen, ganz auffallend breiten, abgerundet rhombischen Fiedern, mit breit keilförmiger Basis, die nur wenig länger als breit sind und sich im Umriß einem Kreise nähern. Sie erinnert etwas an *E. Wendlandiana*, bei der jedoch die seitlichen Ecken der Fiedern scharf ausgeprägt sind. Bemerkenswert ist die Behaarung des Kolbens.

Eremospatha rhomboidea Burret nov. spec. — Caudex cum vagina 1,5 cm et ultra diam. Vagina in ochream oblique sat longe truncatam producta, inermis, glabra. Frondis visae rhachis foliola gerens 75 cm circ. longa, aculeis recurvatis, numerosis simplicibus, apice nigricantibus, distichis. Foliola utrinsecus 6, ut videtur, sat regulariter disposita, utrinque viridia, subtus i. s. pallidiora, omnia et infima conspicue rhomboidea, marginibus evidenter fere rectangulariter prominentibus, maxima latitudine modice supra dimidiam sita, apice triangulari ad margines leviter undulato-dentato. Segmenta superiora praecipue in apice triangulari subtiliter spinulosa, inferiora et praecipue infima in parte inferiore cuneata robustius spinosa. Segmenta majora visa 16 cm circ. longe, 6,5—7 cm circ. lata, inter minus robusta, in parte dextra sinistra costae mediae costulis longitudinalibus robustioribus secundariis 3—4. Nervi transversales densissime sequentes, i. s. paulo prominentes.

Portugiesisch Kongo: Maiombe, Nkonda Mbaku, nahe dem Luali-Fluß, 50 m über dem Meer (J. Goßweiler n. 10086).

Die Art schließt sich an *E. Wendlandiana* an, an die sie in den deutlich rhomboiden Fiedern mit betonten seitlichen Ecken erinnert. Sie sind jedoch viel mehr in die Länge gestreckt. Von *E. Cabrae* ist sie durch die scharf, sogar kurz rechtwinkelig vorspringenden Ecken der deutlich rhombischen Fiedern gut zu unterscheiden.

Lophospatha Burret gen. nov. — Spadix ♂ rhachi, in parte superiore visa, nuda vel spathis paulo evolutis, rudimentariis. Inflorescentia partialis superior basi communi brevi dilatata, spatha communi rudimentaria. Spicae spathis propriis nullis vel obsoletis, laxiuscule amentiformes, spathellis tenuibus, membranaceis, lobatis, haud exacte seriatis. Spathellae flores ♂ 2 vel 1 nascentes, in axilla absconditos, bracteis angustis membranaceis superne penicillato-sericeis suffultos. Calyx tenuis, inferne attenuatus, profunde trilobatus. Corolla inferne in stipem robustum, solidum nonnihil producta, superne petalis subtriangularibus, valvatis, sat robustis. Stamina 6, floris fundo orientes, filamentis superne subulatis. Antherae ovato-oblongae, dithecae, dorso paulo infra dimidiam insertae, thecae rima longitudinali dehiscentes. — Palma haud scandens, humilis, prob. acaulis. Frondes pinnatisectae, rhachi haud in cirrhum producta. Segmenta supra viridia, subtus alba, anguste sublineari-lanceolata, acuminata, apice leviter falcata, basi vix conspicue curvata, superne ad margines setosa, summa utrinsecus confluentia, apicibus liberis, acuminatis.

Die Gattung erinnert an *Salacca*. Es sind jedoch die Spathellae der Ähren des männlichen Kolbens durchaus verschieden. Sie sind nicht lederartig fest und in dichter Folge regelmäßig aneinandergereiht, sondern locker, dünn, gelappt und ganz locker sitzen auch in ihnen die Blüten. Weder sind die einzelnen Ähren mit einer deutlichen, vorgezogenen Spatha versehen wie bei *Salacca* noch die Rhachis an der Basis der Teilinfloreszenzen, diese ist vielmehr unterhalb und oberhalb des Ansatzes der Teilinfloreszenzen nackt, indem die Spathae an dem vorhandenen Material nur schwach und unscheinbar entwickelt sind. Die männlichen Blüten erinnern stark an die von *Salacca*. Der Kelch ist nicht verschieden. Die Krone ist, wie bei dieser, mit einer kräftigen stielartigen, festen Basis versehen, über der freie klappige Petala vorhanden sind. Die 6 Staubblätter entspringen dem Boden der Blüte. Bemerkenswert ist jedoch, daß die Filamente nicht an der Basis, sondern nahe der Mitte des Rückens inseriert sind.