

Au sud de la Maringa, 28 octobre 1913 (Nannan, n. 65. — Très fréquent dans les forêts marécageuses. — Nom ind. : Djodu).

Obs. — Plante caractérisée par des fascicules de 3 fleurs femelles postérieures et de 8 ou 6 fleurs mâles antérieures.

EREMOSPATHA Mann et Wendl.

Eremospatha Laurenti De Wild. nov. spec.

Foliis pennatis, 1 m. 50 longis, basi vaginantibus, vagina apice ligulata, ligula plus minus oblique abscissa, integra, circ. 2 cm longa, rachide basi circ. 2,5 cm. lato, pars inferiore supra leviter canaliculato, pars superiore supra plus minus carinato subacuto, infra basi carinato-subacuto, apice rotundato; cirrha...; rachide basi lateraliter plus minus dense spinoso, spinis plus minus recurvatis, patulo-erectis, usque 5 mm. longis; foliolis basilaribus plus minus reductis, linearilanceolatis usque 8 cm. longis et 3 mm. latis, spinis 5 mm. longis exceptis; foliolis medianis lanceolatis usque 47 cm. longis 4,2 cm. latis, margine plus minus dense ciliato-spinosis, spinis patulo-erectis, vel raro recurvatis, 4-5 mm. longis, nervis numerosis utrinque nervo mediani ultra 10, paulo prominentibus; inflorescentiis axillaribus, rachide ultra 40 cm. longo, ramoso, ramis circ. 36, basi circ. 2 mm. latis; 9-23 cm. longis; floribus geminatis, oppositis vel alternis, 2-6 mm. distantibus; calyce campanulato-cupulato, basi truncato, 3 mm. circ. longo, trilobato, lobis subrotundatis; corolla 7-8 mm. longa, obovoidea, 3-lobata, lobis circ. 3,5 mm. longis, staminibus 6, filamentis late connatis.

Entre Bolobo et Yumbi, 14 avril (M. Laurent, n. 645).

Obs. — Espèce voisine des *E. macrocarpa* et *E. Sapini*.

Eremospatha Sapini De Wild. nov. spec.

Foliis pennatis vaginantibus, vagina apice ligulata, ligula tubulosa 2-4 cm. longa, apice integra oblique abscissa, circa medium plerumque uni vel bi-transversaliter replicata, rachide basi 15-60 mm. lato, infra applanato-rotundato, supra carinato-obtusum, apice cirrhoso, cirrha ultra 1 m. longa, spinosa, spinis subulatis, erectis vel vulgo recurvatis, alternis vel oppositis, triquetris, usque 4 cm. longis, rachide basi et lateraliter plus minus dense spinoso, spinis recurvatis vel erectis, apice nigrescentibus usque 3,5 mm. circ. longis, apice paulo ar-

maticis vel inermis; foliolis basilaribus plus minus reductis, lanceolatis usque 7-8 cm longis et 15 mm. latis, margine dense spinosis, spinis acutis, patulo-erectis usque 5 mm. longis, foliolis medianis linearibus usque ultra 44 cm. longis et 25 mm. latis, apice acutis, plus minus dense ciliato-spinosis, spinis patulo-erectis vel recurvatis circ. 3,5 mm. longis, nervis longitudinalis subaequale elevatis circ. 20; inflorescentiis axillaribus, rachide glabro 58-60 cm. longo, ramis 26-29, basi 4-5 mm. latis, 8-26 cm. longis; floribus geminatis, oppositis vel alternis 2-15 mm. distantibus; calyce campanulato, corolla post anthesim usque circ 8 mm. longa, basi truncata, lobis triangulari-subacutis, marcescentibus, circ. 6 mm. latis; fructibus ellipsoideis vel leviter obovoideis, apice breviter sed plus minus late et abrupte apiculatis, 3 cm. circ. longis et usque 15 mm. latis, squamis 19-21-seriatis circ. 4 mm. latis, longitudinaliter levissime canaliculatis, uniseminatis, semina ovoideo-compressa circ. 2 cm. longa, 9 mm. lata et 6-7 mm. crassa, brunnea.

Thibangu, janvier 1910 (A. Sapin. — Nom. ind. : Lukody; Thikondo [Baluba]).

Obs. — Nous publierons ultérieurement un projet de clef analytique des espèces du genre.

ANCISTROPHYLLUM *Mann et Wendl.*

Ancistrophyllum Laurenti *De Wild.* nov. spec.

Scandens; ramis circ. 35 mm. diam., foliis pennatis vaginantibus, vagina tubulosa dense armata, spinis recurvatis, basi incrassatis et brunneis, apice acutissimis et nigrescentibus, usque 10 mm. longis; vagina apice ligulata, ligula spinosa ultra 8 cm. longa. spinis usque 15 mm. longis gracilibus recurvatis; petiolo usque ultra 50 cm. longo, supra plus minus profunde canaliculato, rachide apice supra plus minus acute carinata, dorso convexo, margine et dorso armato, spinis patulis, recurvatis vel suberectis usque 1 cm. longis, apice cirrhoso; cirrha usque 1 m 50 longa, triangulari, margine acuta, spinis circ. 10-jugis, subulatis, triquetris, recurvatis, alternis vel oppositis usque 5 cm. longis, basi usque 25 cm. distantibus, superioribus minoribus et approximatis; foliolis circ. 23-jugis oppositis vel suboppositis, elliptico-lanceolatis vel lanceolatis, 7-40 cm. longis et 1-4,2 cm. latis, apice acutis, margine breviter et sparse spinosis, spinis circ. 2 mm.