

NUOVI STUDI SULLE PALME ASIATICHE

PALMAE

Trib. LEPIDOCARYEAE

Gen. EUGEISSONIA Griff.

L'*Eugeissonia tristis* di Malacca, descritta da Griffith, il fondatore del Genere, è la specie più anticamente nota. In seguito, nel « Nuovo Giornale botanico » vol. III, p. 18, io stesso ho descritto altre 3 specie di *Eugeissonia*, tutte ben distinte dalla *E. tristis*. Quella che adesso propongo come nuova, sarebbe perciò la quinta del Genere, e forse la più grande.

EUGEISSONIA MAJOR *Becc. sp. n.* — Fructibus magnis, 13 cent. longis, 10 cent. latis, e basi planiuscula ovatis, apice depressiusculo lato in medio umbonato-mamillatis obtusis; squamulis rectiserialiter imbricatis late lanceolatis acuminatis, basi nigra excepta, castaneis, margine scabro, medio depressiusculo-sulcatis, apice non acutis; pericarpio crasso fibroso, endocarpio lignoso, semine sulcis 12 exarato, quorum 6 omnium minores, 3 fere usque ad medium profundi et 3 intermedii.

Abita. — Sul fiume *Kapuas* nella provincia di *Pontianak* in Borneo. Raccolse Teysmann.

Osservazioni. — Ho visto di questa Palma solo alcuni frutti, che mi furono donati dal D.^r Scheffer. È certamente affine alla *Eugeissonia insignis*, dalla quale si distingue per la forma e la dimensione maggiore dei frutti. Dal suo tronco se ne estrae probabilmente del Sagu. Di questa specie credo parli Teysmann nella relazione del suo viaggio in Borneo.