

**Euterpe andina** Burret nov. spec. — Caudex circ. 8—10 m altus, rectus, cylindricus, basi ima tantum incrassatus, ubi circ. 40—50 cm in diam., supra aliquanto tenuior. Frondis rhachis media triangularis, supra acuta, lateribus excavatis, subtus convexa, decidue fusco-furfuracea. Segmenta regulariter, ut videtur, subhorizontaliter disposita, praeter costam mediam et marginales dextra sinistra costis majoribus 3 et ulterioribus minus validis 2 percursa, visa i. s. ad 2,7 cm lata, glabra. Spadix magnus, sub anthesi ad 80 cm longus, primo, ut videtur, fusco-furfuraceus, mox glabratus. Pedunculus 11 cm longus. Spatha inferior anceps, 31 cm longa, superior adulta 95 cm longa, in tertio superiore ad 17 cm lata, 6 cm crasse imposito-mucronata, juventute extus ferrugineo-furfuraceae, demum plus minus glabrescentes, extus laeves, superior lignosa ad 3 mm in diam. Manubrium ad spathae primae annulum 2,5 cm, ad illum secundae, 1 cm in diam., supra bractea semiamplectente, longe triangulari, 4 cm circ. longa, tenui. Rami infimi tantum bracteis ovalibus suffulti, reliqui bracteis late rotundatis, infimi ad 53 cm, supremi 30 cm fere longi, omnes mox glabrati, longitudinem secus acute angulosi, ad apicem tenues, flexuosi. Flores per maximam ramorum partem in glomerulis trifloris, ♀ medio, ad apicem ♂ 2 soli, glabri, insertione ramo vix impressa. Flores glabri, ♂ parvi, plus minus acuti. Stamina 6. Antherae oblongae, 2 mm longitudine haud aequantes, in medio dorso affixae. Pistillodium pyramidatum, 3-cuspidatum.

Colombia: Westkordillere, Dep. Valle, zwischen Cali und Dagua, Alto Mercedes, Urwald, 2000 m, nur in diesem kleinen Teil der Westkordillere gesehen, ca. 8—10 m hohe Palme mit zylindrischem, nur an der untersten Basis verdicktem, geradem Stamm. Kolben feuerrot. Männliche Blüten lila, zu blutreinigendem Tee verwendet, einh. Name „chilco“ (Frau DRYANDER n. 978).

Von bisher bekannten Arten kommt nur *E. frigida* (H. B. K.) Burret in Frage, von der mir die vorliegende schon im Wuchs verschieden zu sein scheint. In dem von mir in Engl. Bot. Jahrb. LXIII (1929) 51 gegebenen Schlüssel reiht sich die Art am besten neben *E. purpurea* Engel ein, von der sie sich schon durch die mehrmals größeren Kolben unterscheidet.

**Syagrus stenopetala** Burret nov. spec. — Petioli fragmentum 30 cm longum visum, circ. 2 cm latum, glabrum, margine acuto, spinis omnino carens, sed hinc inde leviter in fibras tenues lacerato. Laminae fragmentum apicale circ. 40 cm longum visum. Rhachis acute triangularis, glabra. Segmenta in fragmento viso vix conspicue irregularia, inferne prob. per greges disposita, apicalia 19 cm longa, angustissime linearia, sequentia accrescenter latitudine et