

6. G. uliginosa. — Stipite arundinaceo, procero; frondibus pinnatifidis; foliolis linearibus, falcatis, acuminatis; spadice erecto, ramoso.

Hab. in regione sita infra cataractas fluvii Jamundá et floret Septembri. Nullos conspexi flores neque fructus.
(Barb. Rod. hb. Palm. 359).

Stipes est 3^m,2 longus, 0^m,01 altus. Folia 5-7 contemporanea, 0^m,42 longa.

7. G. furcifolia. — Stipite arundinaceo, erecto; foliis indivisis, furcato-bipartitis. Habitus *Bactris simplicifrons*, Martii.

Hab. in superiore fluvio Jamundá. Nulla vestigia florum aut fructuum Septembri.
(Barb. Rod. hb. Palm. 367).

Stipitis longitudo 1^m,1, diametro 0^m,01. Folia 7-8 contemporanea, 0^m,35 longa.

8. G. palustris. — Stipite mediocri, arundinaceo, paullo crassiore quam penna anserina; frondibus pinnatifidis, brevibus; foliolis linearibus, falcatis, longitudinaliter acuminatis.

Hab. in tractibus palustribus ad fluvium Jamundá, et floret Septembri.

(Barb. Rod. hb. Palm. 365).

Stipitis longit. 1^m,4; diametro 0^m,007. Foliis 9-10 contemporaneis, 0^m,47 longis. Spadice erecto, ramoso. Flores et fructus non mihi licuit invenire.